Exercice 1

Partie A : Etude de la fonction f

1. Remarque : $\forall x \in]0;1[$ $x > 0$ et $1 - x > 0$ donc $\ln(x)$ et $\ln(1 - x)$ sont bien définies.

$x \neq 1$ donc $\ln(x) \neq 0$. Donc $f(x)$ est bien définie.

f est dérivable sur $]0;1[$ comme quotient de fonctions dérivables (dont le dénominateur ne s'annule pas)

$$\text{et } \forall x \in]0;1[, f'(x) = \frac{-\frac{1}{1-x} \ln(x) - \ln(1-x) \times \frac{1}{x}}{(\ln(x))^2} = \frac{-x \ln(x) - (1-x) \ln(1-x)}{x(1-x)(\ln(x))^2}$$

2. a. $\forall t \in]0;1[$ $t > 0$ et $t < 1 \Rightarrow \ln(t) < 0$ donc $t \cdot \ln(t) < 0$

b. $\forall x \in]0;1[$ $x \ln(x) < 0$ et $1 - x \in]0;1[$ donc $(1 - x) \ln(1 - x) < 0$

Donc $x \ln(x) + (1 - x) \ln(1 - x) > 0$ (somme de deux termes positifs)

Donc $f'(x) > 0$. Donc f est strictement croissante sur $]0;1[$.

3. a. $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(1 - x) = 0$ $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(x) = -\infty$ donc $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$.

Donc f est prolongeable en 0 en posant $f(0) = 0$.

$$\text{b. } \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{\frac{\ln(1-x)}{\ln(x)} - 0}{x - 0} = \frac{\ln(1-x)}{x \cdot \ln(x)} \quad (\text{forme indéterminée})$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} -x = 0 \text{ donc } \ln(1-x) \sim_0 -x \text{ donc } \frac{\ln(1-x)}{x \cdot \ln(x)} \sim_0 -\frac{x}{x \cdot \ln(x)} \sim_0 -\frac{1}{\ln(x)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} -\frac{1}{\ln(x)} = 0 \text{ donc } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = 0 \text{ donc } f \text{ est dérivable en } 0 \text{ et } f'(0) = 0.$$

4. $\lim_{x \rightarrow 1} \ln(1 - x) = -\infty$ $\lim_{x \rightarrow 1, x < 1} \ln(x) = 0^-$ donc

$$\lim_{x \rightarrow 1, x < 1} f(x) = +\infty.$$

Donc la courbe de f admet une asymptote verticale d'équation $x = 1$.

5. On peut remarque que $f(1/2) = \frac{\ln(1/2)}{\ln(1/2)} = 1$

Partie B

6. g_n est dérivable sur $\mathbb{R}^+$ (fonction polynomiale) et $\forall x \geq 0, g_n'(x) = n \cdot x^{n-1} + 1 > 0$.

Donc g_n est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$.

De plus $g_n(0) = -1$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} g_n(x) = +\infty$ et $0 \in [-1; +\infty[$.

Donc l'équation $g_n(x) = 0$ admet une unique solution u_n sur $\mathbb{R}^+$.

7. $g_n(1) = 1$ $g_n(0) = -1$ $g_n(u_n) = 0$ donc $g_n(0) < g_n(u_n) < g_n(1)$.

Comme g_n est strictement croissante, $0 < u_n < 1$.

8. Pour $n = 1$: $g_1(x) = 2x - 1$ $g_1(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}$ donc $u_1 = \frac{1}{2}$.

De même, $g_2(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 + x - 1 = 0$ $\Delta = 5$

Deux solutions : $x_1 = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$ et $x_2 = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}$ $x_2 < 0$ donc ne convient pas. Donc $u_2 = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}$.

9. a. $\forall x \geq 0, g_{n+1}(x) - g_n(x) = x^{n+1} + x - 1 - (x^n + x - 1) = x^{n+1} - x^n = x^n(x - 1)$

$\forall x \geq 0, x^n \geq 0$ donc l'expression est du signe de $(x - 1)$.

$$\text{Donc } \begin{cases} \forall x \geq 1, g_{n+1}(x) - g_n(x) \geq 0 \\ \forall x \in [0, 1], g_{n+1}(x) - g_n(x) \leq 0 \end{cases}$$

$$b. \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \in [0;1], \text{ donc } g_{n+1}(u_{n+1}) - g_n(u_{n+1}) \leq 0$$

Comme $g_{n+1}(u_{n+1}) = 0$, on a $-g_n(u_{n+1}) \leq 0$ donc $g_n(u_{n+1}) \geq 0$.

$$c. \text{ Donc } \forall n \in \mathbb{N}, g_n(u_{n+1}) \geq g_n(u_n).$$

Comme g_n est strictement croissante : $u_{n+1} \geq u_n$. Donc (u_n) est croissante.

$$10. \text{ On sait que } g_n(u_n) = 0 \quad u_n^n + u_n - 1 = 0 \quad u_n^n = 1 - u_n$$

$$\text{Comme } 1 - u_n > 0 \quad \ln(u_n^n) = \ln(1 - u_n) \quad n \cdot \ln(u_n) = \ln(1 - u_n)$$

$$u_n \neq 1 \text{ donc } \ln(u_n) \neq 0 \quad \text{donc } n = \frac{\ln(1 - u_n)}{\ln(u_n)} \quad f(u_n) = n.$$

11. f est continue et strictement croissante sur $]0;1[$, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = +\infty$, donc f réalise une

bijection de $]0;1[$ sur $]0; +\infty[$, donc admet une application réciproque f^{-1} définie sur $]0; +\infty[$.

$$\forall n \geq 1 \quad f(u_n) = n \text{ donc } u_n = f^{-1}(n)$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = +\infty \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} f^{-1}(x) = 1 \text{ donc par composée } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} f^{-1}(n) = 1.$$

Ou : (u_n) est une suite croissante et majorée par 1, donc elle converge vers un réel $L \leq 1$.

$$u_n^n = \exp(n \cdot \ln(u_n)) \quad \text{si } L < 1 \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(u_n) = \ln(L) < 0 \text{ donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} n \cdot \ln(u_n) = -\infty \text{ donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n^n = 0.$$

Comme $u_n^n = 1 - u_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 - u_n = 1 - L$, on a $0 = 1 - L$ donc $L = 1$ il y a contradiction. Donc $L = 1$.

$$\text{Conclusion : } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1.$$

Exercice 2

$$1) f \text{ est dérivable sur }]0; +\infty[\text{ et } \forall t > 0, f'(t) = 1 - \frac{1}{t^2} = \frac{t^2 - 1}{t^2} = \frac{(t-1)(t+1)}{t^2}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0, t > 0} \frac{1}{t} = +\infty \text{ donc } \lim_{t \rightarrow 0, t > 0} f(t) = +\infty \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t} = 0 \text{ donc } \lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = +\infty$$

t	0	1	$+\infty$
f'(t)	-	0	+
f(t)	$+\infty$		$+\infty$

↙ 2 ↘

2) Par récurrence : _ on sait que u_1 existe et $u_1 = 1 \geq 1$

_ supposons qu'à un rang n , u_n existe et $u_n \geq 1$: alors $n^2 u_n \neq 0$ donc $\frac{1}{n^2 u_n}$ existe donc u_{n+1} existe.

$$\text{De plus } u_n > 0 \text{ donc } \frac{1}{n^2 u_n} \geq 0. \text{ Comme } u_n \geq 1 \quad u_n + \frac{1}{n^2 u_n} \geq 1 + 0 \text{ donc } u_{n+1} \geq 1.$$

Conclusion : $\forall n \in \mathbb{N}$, u_n existe et $u_n \geq 1$.

Ou pour l'hérédité : $u_n \geq 1$ donc $n \cdot u_n \geq n$

$$\text{Sur } [1; +\infty[, f \text{ est croissante donc } f(n \cdot u_n) \geq f(n) \quad \frac{1}{n} f(n \cdot u_n) \geq \frac{1}{n} f(n) \quad u_{n+1} \geq \frac{1}{n} \left(n + \frac{1}{n} \right) \quad u_{n+1} \geq 1 + \frac{1}{n^2} \geq 1$$

$$3) n = \text{int}(\text{input}('n = ')) ; u = 1$$

for k in range(2,n+1): #On calcule de u_2 à u_n

$$u = u + 1 / ((k-1)**2 * u)$$

print(u)

$$\text{Attention : } \forall k \geq 2, u_k = u_{k-1} + \frac{1}{(k-1)^2 u_{k-1}}$$

Ou :

for k in range(1,n): #On calcule u_{k+1} pour k de 1 à $n-1$

$$u = u + 1 / (k**2 * u)$$

$$4) a) \forall n \in \mathbb{N}^*, v_n = u_{n+1} - u_n = \frac{1}{n^2 u_n}$$

$$u_n \geq 0 \text{ et } n^2 \geq 0 \text{ donc } v_n \geq 0 \quad u_n \geq 1 \text{ donc } n^2 u_n \geq n^2 \quad \frac{1}{n^2 u_n} \leq \frac{1}{n^2} \quad v_n \leq \frac{1}{n^2}.$$

b) $\forall n \geq 1, v_n \leq \frac{1}{n^2}$. La série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$ est convergente et les séries sont à termes positifs, donc $\sum_{n \geq 1} v_n$ est aussi convergente.

$$c) \forall n \geq 1, \sum_{k=1}^n v_k = \sum_{k=1}^n (u_{k+1} - u_k) = u_{n+1} - u_1 = u_{n+1} - 1 \quad (\text{somme télescopique})$$

Donc $\forall n \geq 1, u_n = u_1 + \sum_{k=1}^{n-1} v_k$. La série $\sum_{n \geq 1} v_n$ converge, donc par définition la somme partielle $\sum_{k=1}^{n-1} v_k$ converge. Donc (u_n) est une suite convergente.

$$5) a) \forall k \geq 2, \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} = \frac{k - (k-1)}{k(k-1)} = \frac{1}{k(k-1)} \quad k-1 \leq k \text{ donc } (0 <) (k-1)k \leq k^2 \quad (\times k > 0)$$

$$\frac{1}{(k-1)k} \geq \frac{1}{k^2} \quad (\text{fonction inverse décroissante sur }]0; +\infty[\quad \frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$$

$$b) \text{ Si } 2 \leq p < n, \sum_{k=p}^{n-1} v_k = \sum_{k=p}^{n-1} (u_{k+1} - u_k) = \sum_{k=p}^{n-1} \frac{1}{k^2 u_k}$$

$$\forall k \in \{p, \dots, n-1\} \frac{1}{k^2 u_k} \geq 0 \text{ et } \frac{1}{k^2 u_k} \leq \frac{1}{k^2} \quad \text{donc } 0 \leq \sum_{k=p}^{n-1} v_k \leq \sum_{k=p}^{n-1} \frac{1}{k^2} \leq \sum_{k=p}^{n-1} \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right)$$

$$\text{Or par somme télescopique, } \sum_{k=p}^{n-1} \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = \frac{1}{p-1} - \frac{1}{n-1}.$$

$$\text{De plus } \sum_{k=p}^{n-1} v_k = \sum_{k=p}^{n-1} (u_{k+1} - u_k) = u_p - u_n. \text{ Donc } 0 \leq u_p - u_n \leq \frac{1}{p-1} - \frac{1}{n-1}.$$

$$c) \text{ Donc avec } p = 2 : \text{ pour } n \geq 3 \quad 0 \leq u_n - u_2 \leq 1 - \frac{1}{n-1} \leq 1. \quad \text{Donc } u_2 \leq u_n \leq 1 + u_2.$$

$$\text{Or } u_2 = u_1 + \frac{1}{1^2 u_1} = 2 \text{ donc } u_n \in [2; 3].$$

$$d) \forall n > p, 0 \leq u_n - u_p \leq \frac{1}{p-1} - \frac{1}{n-1}.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = L \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{p-1} - \frac{1}{n-1} = \frac{1}{p-1}. \text{ Donc par passage aux limites : } 0 \leq L - u_p \leq \frac{1}{p-1}.$$

e) Si $\frac{1}{p-1} \leq 10^{-4}$, on est sûr que $L - u_p \leq 10^{-4}$, donc que u_p est une valeur approchée de L à 10^{-4} près.

$$\frac{1}{p-1} \leq 10^{-4} \Leftrightarrow p-1 \geq 10^4 \Leftrightarrow p \geq 10\,001.$$

```

u=1
for k in range(2,10002):
    u = u+1/((k-1)**2*u)
print(u)

```

```

Ou :
u=2;p=2;
while 1/(p-1)>10**-4:
    p=p+1
    u = u+1/((p-1)**2*u)
print(u)

```

Attention, il est nécessaire de commencer avec $p = 2$ (et $u = u_2 = 2$), car $\frac{1}{p-1}$ n'est pas défini pour $p = 1$.

Exercice 3

Partie I – Préliminaire

1. h est continue sur $]0; +\infty[$ comme produit de fonctions continues.

En 0 : $\lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \ln(x) = 0$ (par croissances comparées) et $h(0) = 0$, donc h est continue en 0.

Donc h est continue sur $[0; +\infty[$.

2. Si $x \in]0;1[$ $0 < x < 1$, $0 < 1 - x < 1$ donc $g(x) = -x \cdot \ln(x) - (1-x) \ln(1-x)$

$$g(0) = -h(0) - h(1) = 0 \quad g(1) = -h(1) - h(0) = 0$$

g est continue en 0 et en 1 comme somme et composée de fonctions continues.

g est dérivable sur $]0;1[$ comme somme et produits de fonctions dérivables et $\forall x \in]0;1[$,

$$g'(x) = -\ln(x) - x \frac{1}{x} - (-1) \ln(1-x) - (1-x) \frac{-1}{1-x} = -\ln(x) - 1 + \ln(1-x) + 1 = \ln(1-x) - \ln(x).$$

$\ln(1-x) - \ln(x) \geq 0 \Leftrightarrow \ln(1-x) \geq \ln(x) \Leftrightarrow 1-x \geq x$ (car la fonction $\exp$ est croissante sur $\mathbb{R}$)

$$\Leftrightarrow -2x \geq -1 \Leftrightarrow x \leq \frac{1}{2}. \quad g\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2} \ln\left(\frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\ln\left(\frac{1}{2}\right) = \ln(2).$$

x	0	1/2	1
$g'(x)$	?	+	0
$g(x)$	0	$\ln(2)$	0

Partie II – Des variables aléatoires discrètes

3. $U \longrightarrow \mathcal{U}([1;n])$ donc $U(\Omega) = [1;n]$ et $\forall k \in [1;n]$, $P(X = k) = \frac{1}{n}$.

$$\text{Donc } H(U) = -\sum_{k=1}^n h\left(\frac{1}{n}\right) = -\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{n} \ln\left(\frac{1}{n}\right)\right) = -n \frac{1}{n} (-\ln(n)) = \ln(n)$$

4. $X \longrightarrow \mathcal{B}(p)$ donc $\begin{cases} P(X=0) = 1-p \\ P(X=1) = p \end{cases} \quad h(X) = -h(p) - h(1-p) = g(p)$ (avec $p \in]0;1[$)

Donc d'après la partie 1, $h(X) \leq \ln(2)$ et $h(X) = \ln(2)$ pour $p = \frac{1}{2}$.

Exercice 4

Partie I : 1. La probabilité d'obtenir une boule noire est q . Les tirages sont indépendants.

T est le nombre d'essais pour obtenir une boule noire. Donc $T \longrightarrow \mathcal{G}(q)$.

$$\forall k \geq 1, P(T = k) = p^{k-1} \times q \quad E(T) = \frac{1}{q}, \quad V(T) = \frac{1-q}{q^2} = \frac{p}{q^2}.$$

2. On a $U = T - 1$ donc U admet une espérance et une variance et

$$E(U) = E(T) - 1 = \frac{1}{q} - 1 = \frac{p}{q} \quad V(U) = 1^2 V(T) = \frac{p}{q^2}$$

Partie II

1. $\forall k \geq 2$, $(X = k) = (B_1 \cap \dots \cap B_{k-1} \cap N_k) \cup (N_1 \cap \dots \cap N_{k-1} \cap B_k)$

Les tirages sont indépendants) donc $P(X = k) = p^{k-1}q + q^{k-1}p$

$$2. \sum_{k=2}^{+\infty} P(X = k) = \sum_{k=2}^{+\infty} p^{k-1}q + q^{k-1}p = \sum_{j=0}^{+\infty} p^{j+1}q + q^{j+1}p \quad (\text{en posant } j = k - 2)$$

$$= pq \sum_{j=0}^{+\infty} p^j + pq \sum_{j=0}^{+\infty} q^j = pq \times \frac{1}{1-p} + pq \times \frac{1}{1-q} = \frac{pq}{q} + \frac{pq}{p} = p + q = 1$$

$$3. \sum_{k \geq 2} kP(X = k) = q \sum_{k \geq 2} kp^{k-1} + p \sum_{k \geq 2} kq^{k-1}$$

$0 < p < 1$ et $0 < q < 1$ donc les séries convergent absolument. Donc X admet une espérance et

$$E(X) = q \left(\frac{1}{(1-p)^2} - 1 \right) + p \left(\frac{1}{(1-q)^2} - 1 \right) = q \left(\frac{1}{q^2} - 1 \right) + p \left(\frac{1}{p^2} - 1 \right) = \frac{1}{q} + \frac{1}{p} - p - q = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} - 1.$$

$$4. \sum_{k \geq 2} k^2 P(X = k) = \sum_{k \geq 2} k(k-1)P(X = k) + \sum_{k \geq 2} kP(X = k)$$

La deuxième série converge et sa somme vaut $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} - 1$.

$$\sum_{k \geq 2} k(k-1)P(X = k) = \sum_{k \geq 2} k(k-1)(q p^{k-1} + p q^{k-1}) = pq \sum_{k \geq 2} k(k-1)(p^{k-2} + q^{k-2})$$

$$= pq \left(\sum_{k \geq 2} k(k-1)p^{k-2} + \sum_{k \geq 2} k(k-1)q^{k-2} \right)$$

$-1 < p < 1$ et $-1 < q < 1$ donc les séries convergent absolument.

Donc X^2 admet une espérance et

$$E(X^2) = pq \left(\frac{2}{(1-p)^3} + \frac{2}{(1-q)^3} \right) + \frac{1}{p} + \frac{1}{q} - 1 = pq \left(\frac{2}{q^3} + \frac{2}{p^3} \right) + \frac{1}{p} + \frac{1}{q} - 1 = \frac{2p}{q^2} + \frac{2q}{p^2} + \frac{1}{p} + \frac{1}{q} - 1$$

$$= \frac{2(1-q)}{q^2} + \frac{2(1-p)}{p^2} + \frac{1}{p} + \frac{1}{q} - 1 = \frac{2}{p^2} + \frac{2}{q^2} - \frac{1}{p} - \frac{1}{q} - 1$$

$$\text{Donc } X \text{ admet une variance et } V(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \frac{2}{p^2} + \frac{2}{q^2} - \frac{1}{p} - \frac{1}{q} - 1 - 1 - \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} - 1 \right)^2$$

$$= \frac{2}{p^2} + \frac{2}{q^2} - \frac{1}{p} - \frac{1}{q} - 1 - \left(\frac{1}{p^2} + \frac{1}{q^2} + 1 - \frac{2}{p} - \frac{2}{q} + \frac{2}{pq} \right)$$

$$= \frac{1}{p^2} + \frac{1}{q^2} + \frac{1}{p} + \frac{1}{q} - \frac{2}{pq}$$

Exercice 5

1. Si $n \leq N$: on peut avoir de 1 à n cases non vides : $T_n(\Omega) = \{[1 ; n]\}$

Si $n > N$: on peut avoir de 1 à N cases non vides : $T_n(\Omega) = \{[1 ; N]\}$

Donc $T_n(\Omega) = \{[1 ; \min(n, N)]\}$

2. $T_1(\Omega) = \{1\}$ $P(T_1 = 1) = 1$ (loi certaine)

$T_2(\Omega) = \{1, 2\}$ $\text{card}(\Omega) = N^2$ (N possibilités pour chaque boule)

$$P(T_2 = 1) = P(\text{« on place les boules dans la même case »}) = \frac{N \times 1}{N \times N} = \frac{1}{N}$$

(N possibilités pour la première boule, 1 possibilité pour la deuxième)

$$P(T_2 = 2) = P(\text{« on place les deux boules dans deux cases différentes »}) = \frac{N(N-1)}{N^2} = \frac{N-1}{N}.$$

(N possibilités pour la première boule, $N-1$ possibilités pour la deuxième).

i	1	2
$P(T_2 = i)$	$\frac{1}{N}$	$\frac{N-1}{N}$

c) De la même manière

$$(T_n = 1) = \text{« on obtient } n \text{ fois la même case »} \quad P(T_n = 1) = \frac{N \times 1 \times \dots \times 1}{N^n} = \frac{1}{N^{n-1}}$$

$(T_n = 2) = \ll \text{on obtient exactement deux cases différentes} \gg$

Choix des deux cases : $\binom{N}{2} = \frac{N(N-1)}{2}$ possibilités.

Choix de la case pour chaque lancer : 2^n possibilités

Mais il faut enlever les deux cas où on a toujours la même case : Donc $2^n - 2$ possibilités.

$$\text{Donc } P(T_n = 2) = \frac{\frac{N(N-1)}{2} (2^n - 2)}{N^n} = \frac{(N-1)(2^{n-1} - 1)}{N^{n-1}}.$$

Si $n > N$: $(T_n = n)$ est impossible donc $P(T_n = n) = 0$

Si $n \leq N$: $(T_n = n) = \ll \text{chaque boule est placée dans une case différente} \gg$

$$P(T_n = n) = \frac{N(N-1)\dots(N-n+1)}{N^n} = \frac{N!}{N^n(N-n)!}$$

(d) $(T_{n+1} = k) = \ll \text{soit au bout de } n \text{ lancers, on a les boules dans } k \text{ cases et au } (n+1)^{\text{e}} \text{ lancer, on obtient une case déjà utilisée, soit au bout de } n \text{ lancers, on a les boules dans } (k-1) \text{ cases et au } (n+1)^{\text{e}} \text{ lancer, on obtient une case encore vide (il y a en } N - (k-1) = N - k + 1 \text{).}$

Si on note V_{n+1} : « on place la $(n+1)^{\text{e}}$ boule dans une case vide :

$$(T_{n+1} = k) = \left((T_n = k) \cap \overline{V_{n+1}} \right) \cup \left((T_n = k-1) \cap V_{n+1} \right)$$

$$\text{Donc } P([T_{n+1} = k]) = P([T_n = k]) \frac{k}{N} + P([T_n = k-1]) \frac{N-k+1}{N}.$$